

- ① Berechne die die fehlende Länge des rechtwinkligen Dreiecks wie im Beispiel.



Beispiel: gegeben: $a = 6\text{cm}$ $b = 3\text{cm}$ gesucht: c

$$\begin{aligned}
 a^2 + b^2 &= c^2 \\
 (6\text{cm})^2 + (3\text{cm})^2 &= c^2 \\
 36\text{cm}^2 + 9\text{cm}^2 &= c^2 \\
 45\text{cm}^2 &= c^2 & |\sqrt{} \\
 \underline{6,71\text{cm} \approx c}
 \end{aligned}$$

a) $a = 13\text{cm}$ $b = 5\text{cm}$ $c \approx$

b)

c)



- ② Berechne die fehlende Länge des rechtwinkligen Dreiecks. Dafür musst du die Formel des Satz des Pythagoras umstellen wie im Beispiel.

Beispiel: gegeben: $a = 5\text{cm}$ $c = 9\text{cm}$ gesucht: b

$$c^2 - a^2 = b^2$$

$$(9\text{cm})^2 - (5\text{cm})^2 = b^2$$

$$81\text{cm}^2 - 25\text{cm}^2 = b^2$$

$$56\text{cm}^2 = b^2 \quad |\sqrt{}$$

$$\underline{67,48\text{cm} \approx b}$$

a) $a = 13\text{cm}$ $b \approx$ $c = 10\text{cm}$



b)

c)



Hinweis

Die Variable c in der Formel steht für die Hypotenuse im Dreieck. Die Benennung in den Dreiecken kann jedoch nochmal anders sein.



③ Berechne die Seitenlänge a, b und c des rechtwinkligen Dreiecks

a) $a^2 = 25cm^2$ $b^2 = 25cm^2$ $c^2 =$
 $a =$ $b =$ $c =$

b) $a^2 \approx$ $b^2 = 64cm^2$ $c^2 = 169m^2$
 $a =$ $b =$ $c =$

c) $a^2 = 81dm^2$ $b^2 =$ $c^2 = 400dm^2$
 $a \approx$ $b =$ $c =$

d) $a^2 =$ $b^2 = 156mm^2$ $c^2 = 256mm^2$
 $a =$ $b =$ $c =$