

Exkurs: Quersumme

① Berechne die Quersumme der folgenden Zahlen.

- a) $q(67) = \underline{\quad}$ d) $q(85) = \underline{\quad}$ g) $q(84) = \underline{\quad}$
b) $q(33) = \underline{\quad}$ e) $q(31) = \underline{\quad}$ h) $q(35) = \underline{\quad}$
c) $q(66) = \underline{\quad}$ f) $q(55) = \underline{\quad}$ i) $q(42) = \underline{\quad}$

Jede Ziffer braucht
eine eigene Variable.

② Berechne die Quersumme der folgenden Zahlen.

- a) $q(764) = \underline{\quad}$ d) $q(410) = \underline{\quad}$ g) $q(192) = \underline{\quad}$
b) $q(338) = \underline{\quad}$ e) $q(580) = \underline{\quad}$ h) $q(985) = \underline{\quad}$
c) $q(628) = \underline{\quad}$ f) $q(966) = \underline{\quad}$ i) $q(556) = \underline{\quad}$

③ Berechne die Quersumme der folgenden Zahlen.

- a) $q(2682) = \underline{\quad}$ d) $q(1515) = \underline{\quad}$ g) $q(8457) = \underline{\quad}$
b) $q(5844) = \underline{\quad}$ e) $q(7842) = \underline{\quad}$ h) $q(8585) = \underline{\quad}$
c) $q(1625) = \underline{\quad}$ f) $q(6421) = \underline{\quad}$ i) $q(5287) = \underline{\quad}$

④ Berechne die Quersumme der folgenden Zahlen.

- a) $q(973) = \underline{\quad}$ d) $q(715) = \underline{\quad}$ g) $q(3349) = \underline{\quad}$
b) $q(766) = \underline{\quad}$ e) $q(12) = \underline{\quad}$ h) $q(45) = \underline{\quad}$
c) $q(5146) = \underline{\quad}$ f) $q(583) = \underline{\quad}$ i) $q(7738) = \underline{\quad}$

Mischung
der Aufgaben
1-3

In der LaTeX-Formel kann man zwischen
den Ziffern Leerzeichen einfügen, ohne
dass diese ausgegeben werden.